Цитологическая характеристика дисплазии шейки матки: ретроспективный анализ 120 случаев

Алыев Шамистан, Дахази Нармин, Мирзаева Гюнай

Национальный Центр Онкологии, отделение Онкогинекологии, г. Баку, Азербайджан

Актуальность. Дисплазия шейки матки – патологическое изменение эпителия, предшествующее развитию инвазивного рака. Раннее выявление и наблюдение за диспластическими изменениями возможно благодаря скрининговым программам. Цитология — доступный метод первичной диагностики. Настоящее исследование направлено на анализ цитологических данных у женщин с установленной дисплазией.

Цель исследования. Проведен анализ цитологических характеристик дисплазии шейки матки у 120 пациенток. Работа основана на ретроспективном изучении данных мазков по ПАП-тесту.

Материалы и методы. Осуществлен ретроспективный анализ 120 цитологических исследований, выполненных в Национальном центре онкологии за период 2022-2024 гг. Учитывались возраст, воспалительные изменения, наличие ВПЧ-инфекции.

Результаты и обсуждение. Пациентки были распределены по возрастным группам и наличию сопутствующих воспалительных заболеваний: 20-30 лет – 25 пациенток; 30-40 лет – 63 пациентки; 40-50 лет – 32 пациентки.

В первой группе у 43 % пациенток выявлена CIN I, 35 % – CIN II, 22 % – CIN III. Во второй группе у 39 % больных отмечена CIN I, 45 % – CIN II, 16 % – CIN III. В третьей группе у 29 % пациенток выявлена CIN I, 33 % – CIN II, 38 % – CIN III.

Заключение. Цитологическое исследование эффективно при ранней диагностике дисплазии. Его регулярное проведение в сочетании с ВПЧ-диагностикой позволяет своевременно выявлять предраковые изменения.

Ключевые слова: дисплазия, шейка матки, цитология.